

VOUS AVEZ EU UNE EMBOLIE PULMONAIRE ?

REVOYONS ENSEMBLE CE QUI VOUS EST ARRIVÉ

1. VOUS AVEZ EU DES SYMPTÔMES

Pour rappel, l'**embolie pulmonaire** est due à un **caillot de sang** qui bouche une artère menant aux poumons.¹

C'est pourquoi certains symptômes fréquents s'installent brutalement comme une **douleur dans la poitrine** souvent associée à une **respiration difficile**.¹

D'autres signes plus graves peuvent se manifester comme une **accélération** des battements du cœur, un **malaise** ou encore un **refroidissement** de vos mains et de vos pieds.¹



2. VOUS AVEZ ÉTÉ ADMIS À L'HÔPITAL




Un médecin vous a examiné.

Suite à cela, vous avez subi un examen : **L'ANGIOSCANNER THORACIQUE**.¹

Cet examen a servi à obtenir une image des artères de vos poumons grâce à un colorant qui vous a été injecté.² **Un caillot a été détecté sur cette image et a permis d'orienter le diagnostic**. D'autres examens complémentaires ont pu être réalisés pour confirmer le diagnostic.¹

3. VOUS AVEZ REÇU UN TRAITEMENT EN URGENCE

Il s'agit d'un traitement anticoagulant pour **fluidifier le sang et rétablir la circulation sanguine dans l'artère du poumon qui était bouchée**.³



4. VOUS RENTREZ CHEZ VOUS



Maintenant que le caillot est résorbé, votre médecin vous a autorisé à rentrer chez vous et vous a prescrit **un traitement anticoagulant**.³

Celui-ci devra être poursuivi pendant au moins **3 mois** après votre retour à la maison, ceci afin d'éviter la formation d'un autre caillot de sang, qui pourrait causer une nouvelle embolie pulmonaire.³

En plus des médicaments, votre médecin vous conseillera de porter **des bas de contention**. Ils vont exercer une pression sur votre jambe et favoriser la circulation normale du sang dans les veines.³

5. VOTRE MÉDECIN VOUS ACCOMPAGNE

1 mois, 3 mois et 6 mois après votre embolie pulmonaire, un suivi avec votre médecin vous sera proposé pour évaluer le risque de formation d'un nouveau caillot de sang, et pour décider de la suite de votre traitement.⁴

Si votre médecin estime que le risque est trop élevé, il pourra décider de poursuivre au-delà de 3 mois votre traitement anticoagulant.⁴



6. LES CONSIGNES QUE VOUS DEVEZ RESPECTER⁵

RÉALISEZ
tous les suivis
biologiques et
les examens
préconisés

**CONTACTEZ RAPIDEMENT
VOTRE MÉDECIN
OU RENDEZ VOUS AUX
URGENCES DE L'HÔPITAL
LE PLUS PROCHE**
en cas de saignements
inhabituels, de modification
de votre état général
ou en cas de chutes

**PRENEZ
VOS MÉDICAMENTS
TOUS LES JOURS**
aux horaires prévus
en respectant
les doses prescrites
par votre médecin

ÉVITEZ
les situations
propices aux
coupures
ou aux chutes

**SIGNEZ À TOUS
LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ**
que vous prenez des
anticoagulants lors de
vos consultations en leur
présentant votre carte
patient

**N'INTERROMPEZ
JAMAIS VOTRE
TRAITEMENT SANS
EN PARLER À VOTRE
MÉDECIN,**
même si vous
ne vous sentez pas bien

**DEMANDEZ L'AVIS
DE VOTRE MÉDECIN
OU DE VOTRE
PHARMACIEN**
avant toute prise d'un
autre médicament



ATTENTION ! APPELÉZ IMMÉDIATEMENT LE 15

Si vous avez l'un de ces symptômes : douleur dans la poitrine, respiration difficile, accélération des battements du cœur, malaise, refroidissement de vos mains et de vos pieds.¹

L'EMBOLIE PULMONAIRE EST UNE URGENCE MÉDICALE QUI PEUT ENTRAÎNER LE DÉCÈS.²



Bayer HealthCare SAS
Division Pharmaceuticals
Parc Eurasanté - 220, avenue de la Recherche
59120 LOOS - France
www.bayer.fr
Standard : 03 28 16 34 00
Info Med / Pharmacovigilance (N° Vert) :
0 800 87 54 54



Pour en savoir plus
sur votre maladie :
plateforme-alto.fr



1. Ameli. Embolie pulmonaire. Disponible sur : <https://www.ameli.fr/assure/sante/urgence/pathologies/embolie-pulmonaire>. Consulté le 28 février 2022. 2. Ameli. Comment se déroule un scanner ? Disponible sur : <https://www.ameli.fr/assure/sante/examen/imagerie-medicale/deroulement-scanner>. Consulté le 28 février 2022. 3. VIDAL. Embolie pulmonaire. Disponible sur : <https://www.vidal.fr/maladies/recommandations/embolie-pulmonaire-3581.html#prise-en-charge>. Consulté le 28 février 2022. 4. Sanchez O, Benhamou Y, Bertolotti L et al., Recommandations de bonne pratique pour la prise en charge de la maladie veineuse thromboembolique chez l'adulte. Version courte. Revue des Maladies Respiratoires (2019) 36, 249-283. 5. Ameli. Les anticoagulants : importance du suivi pendant le traitement. Disponible sur : <https://www.ameli.fr/assure/sante/medicaments/comprendre-les-differents-medicaments/anticoagulants>. Consulté le 28 février 2022.

